

Après la chirurgie

Les consignes postopératoires doivent être strictement observées afin de favoriser la guérison. Un certain inconfort, dont de l'enflure, est à prévoir à la suite de la chirurgie.

Si vous avez des problèmes ou des inquiétudes suite à une chirurgie d'implantation dentaire effectuée à notre clinique, veuillez nous contacter au **(514) 630-4030**.

POINTS DE SUTURE

La plupart des points de suture que nous utilisons se dissolvent d'eux-mêmes en 4 à 10 jours. Si nous n'utilisons pas de points de suture fondants lors de votre opération, vous en serez informé et un rendez-vous vous sera donné pour les retirer (généralement 7 à 10 jours après l'opération).

HYGIÈNE BUCCALE

Il suffit de nettoyer le pilier de cicatrisation (le petit capuchon qui dépasse de la gencive) 2 fois par jour avec un coton-tige. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 à 10 secondes et doit être fait en douceur.

Nous vous demandons de ne pas broser la zone opérée pendant les 7 à 10 premiers jours afin d'éviter de provoquer de l'irritation ou des perturbations (et après, uniquement avec une brosse douce adaptée).

Vous devez vous rincer la bouche doucement avec de l'eau salée 4 à 5 fois par jour (1 cuillère à soupe de sel par tasse d'eau). N'utilisez les rince-bouches que s'ils vous ont été prescrits. Les bains de bouche réguliers doivent être évités jusqu'à ce que votre chirurgien les autorise car ils peuvent irriter les plaies et ralentir la cicatrisation.

MÉDICAMENTS CONTRE LA DOULEUR

La plupart des patients ressentent un inconfort relativement minime après la pose des implants dentaires et n'ont généralement besoin que d'un médicament antidouleur en vente libre.

Si la prise d'un médicament plus puissant devait s'imposer, nous nous ferions un plaisir d'envoyer une ordonnance à votre pharmacie.

Si des antibiotiques sont prescrits, il est très important de les prendre selon les indications et jusqu'à la fin du traitement.

DIÈTE

Vous devez éviter d'utiliser la zone de l'implant pour mâcher tout aliment pendant les 3 ou 4 premières semaines.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

L'activité physique n'est pas restreinte après la pose d'implants dentaires, mais nous recommandons d'éviter tous sports de contact pendant 3 à 4 semaines afin de prévenir les risques d'impacts sur la zone opérée.

Évitez de toucher la région opérée et de tirer sur vos joues afin de visualiser la zone concernée. Cela pourrait endommager la gencive et fragiliser les points de suture.



Dr. CLAUDE DAVID SPRCP inc.

Clinique de chirurgie buccale et maxillo-faciale

IMPLANTS DENTAIRES

guide du patient

Dr. Claude David D.D.S.

Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Centre d'implantologie
Chirurgie esthétique

Sans frais : 1 866 330-4030 • 514 630-4030

cdavid@drclaudedavid.com



Dr. CLAUDE DAVID SPRCP inc.

Clinique de chirurgie buccale et maxillo-faciale